

ALTERACIONS DE LA CONCIÈNCIA

Cada vegada més a prop de les persones



Alteracions de la consciència

Alteracions de la consciència

La pèrdua de l'estat de l'alerta davant de sensacions sensorials i la pèrdua de moviments voluntaris, produeix una sensació d'impotència per part del sanitari.

Mante els signes vitals, com poden ser de respiració i circulació.

Cada vegada més a prop de les persones



Lipotímia

És un estat on sofim una atenuació de l'estat d'alerta però generalment no arribem a perdre totalment el coneixement.

Si l'episodi continua i no es reverteix pot degenerar en un síncope.

CAUSES

- Emocions intenses, visions desagradables.
- Calor excessiu i ambients tancats.
- Estar de peu sense poder seure.
- Alteracions de la tensió arterial.
- Por.
- Dietes estrictes.
- Exercici excessiu.

Cada vegada més a prop de les persones



Lipotímia

SINTOMES

- Sensació de mareig.
- Fluïxesa en les cames.
- Sensacions auditives i visuals.
- Pell pàl·lida, freda i amb suor.

Actuació

- Estirar a la víctima en un lloc fresc de cúbit supí.
- Afluixar la roba.
- Deixar que li adongui l'aire.
- Posar-la en "Trendelenburg".



Cada vegada més a prop de les persones



Coma

És un estat sever de pèrdua de consciència que pot ser el resultat d'una gran varietat de condicions incloent-hi la intoxicació per drogues, alcohol o altres tòxics), anomalies metabòliques (hipoglucèmia, hiperglucèmia, cetosi), malalties del sistema nerviós central ictus, traumatisme crani-encefàlic, convulsions i hipòxia. Les causes metabòliques són les més freqüents.

El coma es una expressió d'un fort trastorn de les funcions cerebrals i per tant amb perill de mort. El (pronòstic) del pacient amb coma depèn de les malalties subjacents i de l'assistència mèdica.

Cada vegada més a prop de les persones



Coma

TIPUS DE COMA

- Traumàtic
- Tòxic
 - Etílica
 - Barbitúric
 - Monòxids de carbó
- Metabòlic
 - Hepàtic
 - Diabètic
- Neurogènic
 - AVC
 - Epilèptic

SINTOMES

- No respon a estímuls externs.
- Te pols i respiració.
- Pot perdre el pols perifèric.

ACTUACIÓ

- Afluixar la roba que pugui comprimir.
- Mantenir la via aèria permeable.
- Control periòdic dels signes vitals.
- PLS (si no traumàtic)
- Trucar al 112 i SVB si requereix.

Cada vegada més a prop de les persones



Coma

Traumàtic

- Traumatisme cranial, de columna o politraumatisme.

Tòxic

- Per ingesta de productes tòxics.

Metabòlic

- Alteracions en el funcionament del cos.

Neurogènic

- Alteracions del sistema nerviós central.

Cada vegada més a prop de les persones



Escala de Glasgow

Es una escala neurològica dissenyada per avaluar el nivell de consciència dels pacients que han sofert un trauma cranioencefalic (TCE), durant les primeres 24 hores posttrauma.

Resposta ocular	
Esponàniament	4
A l'ordre	3
Al dolor	2
Nul·la	1

15 normal
12 trauma agut
10 trauma urgent
7 emergència
<5 trauma causa irreversible

Resposta motora	
Reacciona a ordres	6
Localitza el dolor	5
Retira al dolor	4
Flexió inadequada	3
Extensió inadequada	2
Ninguna	1

Resposta verbal	
Orientada	5
Confusa	4
Inadequades	3
Incomprensible	2
Nul·la	1

Cada vegada més a prop de les persones



Humanitat
Imparcialitat
Neutralitat
Independència
Caràcter
Voluntari
Unitat
Universalitat



www.cruzroja.es 902 22 22 92