

LESIONS ULLS, ORELLA I NAS

Cada vegada més a prop de les persones



Lesions ulls, orella i nas

Ulls

Aquests òrgans ens permeten veure el que ens envolta. La seva funció es captar la llum i transmetre la imatge que reflexa aquesta llum al cervell.

Lesions que es poden produir en els ulls:

- Cos estrany.
- Aerosol d'autodefensa.
- Ferides.
- Cremades

Cada vegada més a prop de les persones



Ulls

Cos estrany

Una borla de pols, una pestanya solta, inclús una lent de contacte poden "flotar" sobre el blanc de l'ull, però haurem de prestar molta atenció amb objectes clavats, o que estiguin a la part amb color de l'ull, ja que el podria malmetre.

Actuació:

- Recomanarem a la víctima que s'assegui de cara a la llum.
- Evitarem que es refregui els ulls.
- Separarem amb molt de compte les parpelles, examinarem l'ull.
- Si podem veure un cos estrany a la part blanca, la rentarem deixant fluir aigua neta, utilitzant u vas, o amb col·liri estèril.
- Si no poguéssim o intentarem amb una turunda o una cantonada humida d'un mocador.

Cada vegada més a prop de les persones



Ulls

Aerosols d'autodefensa

Generen irritació als ulls i a la via aèria superior i poden causar vòmits. Els efectes solen desaparèixer en quinze minuts, encara que les molèsties oculars poden durar més temps.

Actuació:

- Portarem a la víctima a una zona ventilada.
- Evitarem que es refregui els ulls.
- Si es necessari bufarem als ulls per accelerar la evaporació del líquid.

Cada vegada més a prop de les persones



Ulls

Ferides

L'ull pot ser lesionat per cops directes o fragments d'algun material. Totes aquestes ferides poden ser greus, degut al risc per a la visió.

Actuació:

- Estirarem a la víctima de cúbit supí, i l'indicarem que mantingui els ulls immòbils.
- Farem que subjecti una gasa estèril o apòsit net sobre l'ull, si fos necessari la fixarem.

Cada vegada més a prop de les persones



Ulls

Cremades químiques

El contacte accidental de l'ull amb un producte químic pot causar lesions que afectin a la visió incloent la ceguera.

La prioritat es netejar per poder diluir i dispersar el producte.

Actuació:

- Utilitzarem protecció.
- Mantindrem l'ull afectat sota una caiguda d'aigua durant uns 20 minuts, hem d'anar en compte que el químic no vagi a cap altre part del cos.
- Si l'ull es tanca per espasme de dolor, obrirem les parpelles suaument.
- Si no podem seguir el amb el rentat durant el trasllat, taparem l'ull amb un apòsit estèril o el mes net possible.
- Identificarem el producte químic que ha causat els danys.

Cada vegada més a prop de les persones



Ulls

Cremades lumínica

També coneguda amb el nom de queratitis actínica, es produeix quan la superfície de l'ull sofreix danys per l'exposició a la llum ultraviolada. Com el reflexa del sol a la neu o la brillantor d'un soldador.

Els símptomes poden tardar en aparèixer i la recuperació pot tardar fins una setmana.

Actuació:

- Taparem l'ull afectat amb una gasa.
- Proporcionarem trasllat per assistència sanitària.

Cada vegada més a prop de les persones



Oïdes

És la part visible del pavelló auditiu, que canalitza el so que farà vibrar el timpà mitjançant del conducte auditiu.

L'oïda a part d'aportar-nos aquest sentit, juga un paper important en l'equilibri.

Lesions que es poden produir en l'oïda:

- Introducció de cos estrany.
- Dolor.
- Hemorràgia.
- Vertigen.

Cada vegada més a prop de les persones



Oïdes

Cos estrany

Pot provocar pèrdua del sentit temporal i bloquejar el conducte auditiu. En ocasions es pot danyar el timpà. També pot entrar algun insecte, sent molt molest per la víctima.

Actuació:

- Tranquil·litzarem a la víctima i la derivarem a un centre sanitari.
- No intentarem retirar l'objecte.
- Si es tracta d'un insecte, farem que la víctima s'inclini cap a la banda de l'oïda que no te el insecte. Aplicarem aigua tèbia l'oïda per ha que aquest suri.

Cada vegada més a prop de les persones



Oïdes

Dolor

El seu origen es la inflamació de teixits interns, o el seu tamponament. La causa més comuna es per una infecció o un cos estrany.

Actuació:

- Si te medicació prescrita l'ajudarem a prendre-la.
- Acomodarem a la víctima i aplicarem calor local.
- Recomanarem consulta amb el seu metge.

Cada vegada més a prop de les persones



Oïdes

Hemorràgia

Generalment es produïda per una perforació del timpà, causada per exemple per un cos estrany o un cop contra el lateral de cap o per una explosió. Dolor agut, pèrdua de percepció auditiva i marejos son alguns dels símptomes. També per TCE.

Actuació:

- Recolzarem a la víctima sobre el costat de l'hemorràgia, i subjectarem un apòsit suaument..
- Es proporcionarà trasllat a un centre sanitari.

Cada vegada més a prop de les persones



Oïdes

Vertigen

Alteració del sentit de l'equilibri. El vertigen es una sensació anormal de moviment: la víctima és sent marejada, com si estigues en moviment.

Actuació:

- Recomanarem que la víctima es posi el mes còmoda possible, li preguntarem si es el primer episodi que pateix.
- Si la víctima pren medicació especial per al vertigen li ajudarem a consumir-la.
- Si es veu convenient s'avisarà al metge.

Cada vegada més a prop de les persones



Nas

Aquesta cavitat connecta amb el coll. Esta recoberta de membranes que segreguen moc per atrapar impureses quan entren en aquest.

Lesions que es poden produir en el nas:

- Introducció de cos estrany.
- Hemorràgia.
- Fractura

Cada vegada més a prop de les persones



Nas

Cos estrany

Poden bloquejar el conducte i/o provocar infeccions. El objectes punxants poden danyar teixits. Les piles de boto poden casar cremades i hemorràgies.

Actuació:

- Tranquil·litzarem a la víctima.
- Farem que la víctima respiri per la boca.
- En cap cas intentarem retirar l'objecte.
- La derivarem a un centre sanitari.

Cada vegada més a prop de les persones



Nas

Hemorràgies

Poden bloquejar el conducte i/o provocar infeccions. El objectes punxants poden danyar teixits. Les piles de boto poden casar cremades i hemorràgies.

Actuació:

- Demaneu-li que s'assegui i inclini el cap endavant per metre la sortida de la sang.
- Indiqueu a la víctima que respiri tranquil·lament per la boca i que pressioni el nas per la part tova, amb els dits polze i índex.
- Ha de romandre amb el nas pinçat.
- Al cap de 10 minuts, allibereu la pressió si l'hemorràgia no s'atura, repetiu la operació i si persisteix truqueu al 112.

Cada vegada més a prop de les persones



Nas

Fractura

La inflamació dels teixits pot causar dificultats respiratòries. Aquesta lesió sempre s'haurà de avaluar en un hospital.

Veurem que sol haver desplaçament en la forma del nas i inflamació.

Actuació:

- Aplicarem fred local.
- Si existeix epistaxis la tractarem.
- La derivarem ha un centre hospitalari per a la seva posterior avaluació.

Cada vegada més a prop de les persones



Humanitat
Imparcialitat
Neutralitat
Independència
Caràcter
Voluntari
Unitat
Universalitat

