

ANAFILAXI I AL·LÈRGIES

Cada vegada més a prop de les persones



Anafilaxi i al·lèrgies

Introducció

La anafilaxi consisteix en una resposta al·lèrgica generalitzada per varis punts del cos, posterior a l'entrada de grans quantitats d'alguna substancia a la que la víctima es sensible.

Al estar present en una part importat de l'organisme, o inclús en tot ell, les reaccions poden consistir des d'una simple urticària o congestió del nas, fins a la pèrdua de la consciència, depenent de la quantitat i rapides de propagació de l'antigen.

L'organisme reacciona alliberen una substancia anomenada histamina i altres substancies que son responsables dels símptomes de la reacció al·lèrgica.

Cada vegada més a prop de les persones



Introducció

On tenim la histamina?

La histamina és troba emmagatzemada en unes cèl·lules anomenades Mastòcits.

On es troben els mastòcits?

Els mastòcits estan distribuïts per tot l'organisme, però es concentren en el sistema respiratori i la pell. Per aquest motiu les reaccions al·lèrgiques son més freqüents localitzar-les en aquestes zones.

Cada vegada més a prop de les persones



Nivell d'intensitat

Lleu

- Urticària: Erupció d'aparició ràpida i progressiva, amb taques acompanyades de picor intens.
- Formigueig en peus i mans.
- Calor general.
- Angioedema: edema localitzat a la cara, amb inflamació de les parpelles, llavis, llengua i certa dificultat per tragar.
- Congestió nasal.
- Picor en els palmells de les mans i plantes dels peus.

Cada vegada més a prop de les persones



Nivell d'intensitat

Moderada

- Broncospasme: Dificultat per respirar, tos, sorolls en el pit i fatiga.
- Edema a la laringe: Inflamació en el coll que dificulta la respiració i el tragar. Canvis en la veu.
- Vòmits, moviments intestinals i diarrea.
- Ansietat.

Cada vegada més a prop de les persones



Nivell d'intensitat

Greu

- Estridor a la laringe: Soroll característic que produeix la laringe com a conseqüència d'estar tancada. La víctima pràcticament no pot parlar.
- Dificultat respiratòria extrema.
- Cianosis: Coloració violàcia dels llavis, de la pell i de las ungles.
- Parada respiratòria.
- Diarrea.
- Ganes incontrolables d'orinar.
- Rampes i convulsions.
- Hipotensió i arítmia cardíaca.
- Xoc.
- Coma.

Cada vegada més a prop de les persones



Actuació

Què hem de fer?

- Tranquil·litzar a la víctima.
- Controlar els signes vitals.
- Controlar la via aèria i col·locar a la víctima semisentada.
- Vigilar els signes de xoc (anafilàctic).
- Activar 112 i proporcionar trasllat.

Cada vegada més a prop de les persones



Humanitat
Imparcialitat
Neutralitat
Independència
Caràcter
Voluntari
Unitat
Universalitat

