

PICADES I MOSSEGADES D'ANIMALS

Cada vegada més a prop de les persones



Picades i mossegades animals

Introducció

En general els animals que trobem en el nostre entorn no ataquen a l'home si no se senten amenaçats. El resultat del seu atac són les picades i mossegades.

Quan pica l'animal inoculara el verí, que és una substància tòxica. Quan mossega, es produeix una ferida.

Cada vegada més a prop de les persones



Picades produïdes per animals terrestres

Hi ha diferents tipus d'espècies animals que produeixen aquest tipus de lesió. En els artròpodes (insectes, aranyes i escorpins) trobem el ventall més ampli de possibles animals agressors, però les lesions que produeixen no solen ser greus.

Una picada pot ser greu si compleix algunes de les condicions següents:

- Si les picades són múltiples.
- Segons la localització (cara, coll), si afecta l'interior de la boca.
- Si la persona és hipersensible o al·lèrgica al tòxic.
- Si la víctima és un lactant, un infant petit o una persona molt gran o amb malalties.

Els insectes que més sovint piquen són els mosquits, els tàvecs, les abelles, les vespes i les paparres.

Hem de tenir en compte que alguns poden transmetre malalties.

Cada vegada més a prop de les persones



Picades d'insectes

Signes i símptomes

- Dolor més o menys intens.
- Inflamació.
- En el cas de les abelles es pot observar el fibló clavat.
- Picor

El més normal es que remetin espontàniament en 24-48 hores.

Què hem de fer?

- Netejar la picada com si fos una ferida.
- Col·locar compreses fredes.
- En el cas de les picades d'abelles, hem de retirar el fibló amb molta cura.

Què no hem de fer?

- Fregar o rascar la zona de la picada.
- Aplicar escalfor local.
- Posar pomades o ungüents.
- Intentar retirar el fibló sense mitjans o sense saber com fer-ho.

Cada vegada més a prop de les persones



Picades d'aràcnids (aranyes, paparres i escorpins)

Signes i símptomes

- Dolor.
- Inflamació.
- Envermelliment de la zona.

Què hem de fer?

Paparres

- Mullar-les amb productes insecticides apropiats.
- Quan s'hagin mort, amb unes pinces o amb els dits protegits per guants, estirar el cos sense trencar-lo.
- Netejar la ferida.
- Si no es sap fer, millor acudir al centre sanitari.

Cada vegada més a prop de les persones



Picades d'aràcnids (aranyes, paparres i escorpins)

Picades d'aranya o escorpí

- Netejar i tractar la ferida com ha tal.
- Col·locar compreses fredes o gel protegit.
- Mantenir en repòs l'extremitat o zona afectada.
- Consultar els serveis assistencials més pròxims.

Què no hem de fer?

- Intentar treure la paparra viva, estirant-la.
- Intentar matar la paparra amb foc, calor o altre mitjans no adequats.
- Aplicar calor local.
- Aplicar un torniquet
- Fer talls i succionar la sang.
- Posar pegats o unguents.
- Prendre medicació no prescrita.

Cada vegada més a prop de les persones



Picades d'ocells

Les aus domèstiques són font de nombrosos contagis a través de les lesions que produeixen amb el bec.

Què no hem de fer?

- Tractar la ferida com a tal.
- Consultar en un centre de salut.
- Consultar l'estat vacunal.

Cada vegada més a prop de les persones



Mossegades d'animal

Mossegades de gos

De totes les mossegades produïdes per animals, aproximadament el 90% són de gos.

La mossegada de gos produeix una ferida que pot anar des d'una simple rascada a un arrencament de carn, amb la consegüent hemorràgia. Solen produir-se a les extremitats. Com que la boca dels gossos està contaminada, hem de considerar que la mossegada és una ferida amb risc d'infecció.

Mossegades de gat

Són menys freqüents que les de gos, però són igualment perilloses per les infeccions. No solen produir ferides amb arrencament, però les seves dents punxegudes provoquen ferides amb alt risc d'infecció.

Cada vegada més a prop de les persones



Mossegades d'animal

Què hem de fer?

- Netejar les ferides superficials.
- Contenir l'hemorràgia i tapar les ferides greus.
- Alertar al 112 o traslladar a la víctima a un centre sanitari.
- Es important controlar l'animal atacant, per saber si està vacunat contra la ràbia.

Cada vegada més a prop de les persones



Mossegades de serp

Al nostre país podem trobar escurçons i colobres verinoese autòctones. En general la serp és un animal tranquil i poc agressiu, que quan sent soroll s'escapa. Només ataca si es veu amenaçada o algú s'interposa en el seu camí.

Les seves mossegades són, bàsicament, una ferida. La majoria de cops mosseguen a les extremitats inferiors.

Signes i símptomes

- Inflamació local.
- Dolor.
- Empremta deixada per la mossegada.

Si hi ha hagut inoculació del verí, pot produir

- Alteracions neurològiques, ansietat, vòmits, nàusees, convulsions.
- Alteració o pèrdua de la consciència.

Cada vegada més a prop de les persones



Mossegades de serp

Què hem de fer?

- Clamar la víctima.
- Ajeure-la a terra i procurar que no es mogui, per evitar que la circulació sanguínia incrementi l'absorció del verí.
- Netejar la ferida.
- Si la mossegada es en una extremitat la immobilitzarem.
- Trucar al 112.

Què no hem de fer?

- Fer un tall a la ferida.
- Succionar el verí.
- Aplicar-hi calor local.
- Afavorir l'activitat física.
- Aplicar remeis casolans.
- Retardar l'evacuació per no tenir confirmada que sigui verinosa.

Cada vegada més a prop de les persones



Lesions produïdes per animals marins

Alguns dels animals que viuen al mar que envolta el nostre país tenen uns mecanismes de defensa o de caça que ens poden causar lesions si accidentalment establim contacte amb ells.

Contacte amb animals urticants(meduses, anemones...)

Quan una persona entre en contacte amb una anemone o una medusa es produeix una lesió urticant que pot arribar a ser molt dolorosa i que en alguns casos d'hipersensibilitat, es pot complicar amb una reacció anafilàctica generalitzada i problemes respiratoris. Encara que no sigui viva o no estigui sencera pot produir lesions.

Cada vegada més a prop de les persones



Lesions produïdes per animals marins

Signes i símptomes

- Dolor intens.
- La zona de la lesió es torna vermella, calenta i s'inflama.
- La lesió pot tenir la forma i el trajecte dels tentacles.
- Poden quedar-hi restes dels tentacles adherits.
- Mal de cap, angoixa.

Què hem de fer?

- Acudir a un lloc de socors o centre sanitari.
- En cas de no haver-hi cap:
 - Rentar la pell amb aigua salada.
 - Es pot rentar la zona lesionada amb vinagre o suc de llima.
 - Si es en un zona sensible o molt extensa, visitar el centre sanitari.
 - Calmar l'angoixa de la víctima.
 - Si apareixen complicacions, avisar al 112.

Cada vegada més a prop de les persones



Lesions produïdes per animals marins

Què no hem de fer?

- Fregar la ferida.
- Aplicar calor local.
- Dutxar-se amb aigua dolça.
- Aplicar-hi pomades, ungüents.
- Exposar la zona al sol després d'una picada.

Cada vegada més a prop de les persones



Humanitat
Imparcialitat
Neutralitat
Independència
Caràcter
Voluntari
Unitat
Universalitat

